Lactana®
BIO Folgemilch 2

nach dem 6. Monat
+ BIFIDO Kulturen
+ DHA + ARA***

DE-ÖKO-001
EU/Nicht-EU-Landwirtschaft

EIGENSCHAFTEN

* *enthält DHA (Docosahexaensäure, lt. Gesetz), welche zur normalen Entwicklung der Sehkraft bei Säuglingen beiträgt. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 100 mg DHA ein. DHA gehört zur Familie der Omega-3-Fettsäuren.*

** *Arachidonsäure gehört zur Familie der Omega-6-Fettsäuren*

✓ *enthält wertvolle Bifido-Kulturen*

✓ *enthält natürliche Alpha-Linolensäure (Omega-3) für die Entwicklung von Gehirn und Nervenzellen (lt. Gesetz)*

✓ *enthält Vitamin A für das Immunsystem und Eisen für die geistige Entwicklung (lt. Gesetz)*

✓ *eignet sich nach dem 6. Monat im Anschluss an das Stillen oder wenn das Baby von* ***Lactana Bio Anfangsmilch 1*** *nicht mehr richtig satt wird*

✓ *ist auf das stärkere Hungergefühl und die speziellen Ernährungsbedürfnisse des Babys abgestimmt*

✓ *erfüllt höchste Qualitätsansprüche nach neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen*

✓ *entspricht dem Standard der EG-Öko-Verordnung: Es werden hochwertige Bio-Milch und weitere Bestandteile aus ökologischem Landbau verwendet*

ZUTATEN

Magermilch[1,2], ***Molkenerzeugnis***[1], *Pflanzliche Öle*[1] *(Palmöl*[1,3], *Sonnenblumenöl*[1], *Rapsöl*[1]*), Maltodextrin*[1], ***Lactose***[1],*Stärke*[1], ***Magermilchpulver***[1,2], *Docosahexaensäure aus* ***Fischöl***, *Calciumcitrat, Eisensulfat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Vitamin C, Arachidonsäure aus Öl aus Mortierella alpina, Natriumcitrat, Zinksulfat, Magnesiumhydrogenphosphat, L-Tyrosin, L-Tryptophan, Kupfersulfat, Bifidobakterienkulturen (B.breve, B.bifidum, B.infantis, B.longum), Vitamin E, Vitamin A, Vitamin D, Natriumselenit, Niacin, Mangansulfat, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin K, Folsäure, Biotin, Vitamin B1, Vitamin B6, Kaliumjodat.*

1 aus biologischer Erzeugung
2 aus Allgäuer Bio-Milch
3 Bio-Palmöl aus nachhaltigem Anbau

Stand: Oktober 2021

SEIT 1911
Töpfer

Lactana® BIO Folgemilch 2

WICHTIGE HINWEISE

- *Für Babys ist ausschließliches Stillen in den ersten 6 Monaten ideal. In dieser Zeit sollte **Lactana Bio Folgemilch 2** – wie jede Folgemilch – nicht als Muttermilchersatz verwendet werden, sondern erst nach 6 Monaten als Bestandteil einer gemischten Ernährung. Individuelle Wachstums- und Ernährungsbedürfnisse des Babys können es aber erforderlich machen, Folgenahrungen als Teil einer Mischkost bereits früher in den Speiseplan aufzunehmen. In diesem Fall bitte vom Kinderarzt beraten lassen. Bitte auf eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise achten.*
- *Für die Zähne ist häufiger oder dauernder Kontakt mit kohlenhydrathaltigen Nahrungen schädlich. Dieser kann schwere Zahnschäden (Karies) verursachen. Wie alle Säuglingsnahrungen enthält **Lactana Bio Folgemilch 2** Kohlenhydrate, z. B. Lactose. Eine Flaschenmahlzeit sollte deshalb nur so lange dauern wie der eigentliche Trinkvorgang. Bitte die Flasche nicht als Schnullerersatz oder zum Dauernuckeln überlassen und für eine regelmäßige Zahnpflege sorgen.*

HANDELSFORM
PULVER: Packung mit 600 g (2x 300 g) unter Schutzatmosphäre abgepackt

BESTELLNUMMER
Art.: 6051701
PZN: 06081910
GTIN: 4006303005762

SEIT 1911 Töpfer

Stand: Oktober 2021

Lactana® BIO Folgemilch 2

Zusammensetzung im Durchschnitt enthalten		Pro 100 ml trinkfertig++
Brennwert	kJ kcal	277 66
Fett, davon:	g	3,2
gesättigte Fettsäuren	g	1,1
einfach ungesättigte Fettsäuren	g	1,4
mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon:	g	0,7
Linolsäure (Omega-6)	mg	567
α-Linolensäure (Omega-3)	mg	46
Docosahexaensäure (DHA, Omega-3)	mg	17
Arachidonsäure (ARA, Omega-6)	mg	8,7
Kohlenhydrate, davon:	g	8,0
Zucker	g	5,2
davon: Lactose	g	5,1
Stärke	g	0,9
Eiweiß	g	1,4
Vitamine		
Vitamin A	µg	59,2 (15 %)
Vitamin D	µg	1,7
Vitamin E	mg	1,6
Vitamin K	µg	7,3
Vitamin C	mg	14
Thiamin (Vitamin B1)	mg	0,064
Riboflavin (Vitamin B2)	mg	0,15
Niacin	mg	0,50
Vitamin B6	mg	0,054
Folsäure	µg	13,8
Vitamin B12	µg	0,17
Biotin	µg	1,8
Pantothensäure	mg	0,47
Mineralstoffe		
Natrium	mg	28,8
Kalium	mg	72,8
Chlorid	mg	51,8
Calcium	mg	64,3
Phosphor	mg	34,7
Magnesium	mg	6,39
Eisen	mg	0,81 (10 %)
Zink	mg	0,45
Kupfer	mg	0,052
Mangan	mg	0,014
Fluorid	mg	< 0,010
Selen	µg	3,2
Jod	µg	15,5
% gemäß Referenzwert		

Die Analysenwerte unterliegen den bei Erzeugnissen aus Naturprodukten üblichen Schwankungen.
++ Standardzubereitung: 13,3 g Pulver + 90 ml Wasser

Zutaten: **Magermilch**[1,2], **Molkenerzeugnis**[1], Pflanzliche Öle[1] (Palmöl[1,3], Sonnenblumenöl[1], Rapsöl[1]), Maltodextrin[1], **Lactose**[1], Stärke[1], **Magermilchpulver**[1,2], Docosahexaensäure aus **Fischöl**, Calciumcitrat, Eisensulfat, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Vitamin C, Arachidonsäure aus Öl aus Mortierella alpina, Natriumcitrat, Zinksulfat, Magnesiumhydrogenphosphat, L-Tyrosin, L-Tryptophan, Kupfersulfat, Bifidobakterienkulturen (B.breve, B.bifidum, B.infantis, B.longum), Vitamin E, Vitamin A, Vitamin D, Natriumselenit, Niacin, Mangansulfat, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin K, Folsäure, Biotin, Vitamin B1, Vitamin B6, Kaliumjodat.

[1] aus biologischer Erzeugung [2] aus Allgäuer Bio-Milch
[3] Bio-Palmöl aus nachhaltigem Anbau

Bio-Folgemilch

Hergestellt in Deutschland
Töpfer GmbH · D-87463 Dietmannsried/Allgäu
Originalverschlossen mindestens haltbar bis: siehe Bodenprägung

℮ 600 g
2 x 300 g

SEIT 1911

Töpfer

Stand: Oktober 2021

Lactana® BIO Folgemilch 2

Lactana Bio Folgemilch 2

RICHTIG ZUBEREITEN (DOSIERUNG SIEHE TABELLE)

2

1. Benötigte Trinkwassermenge frisch abkochen und auf ca. **40°C - 50°C** abkühlen lassen.
2. Die Hälfte des Wassers in die Trinkflasche füllen – **vor** Gebrauch Flasche und Sauger auskochen.
3. Mit dem Messlöffel die erforderliche Pulvermenge in die Flasche geben. Messlöffel immer glatt abstreifen.
4. Flasche verschließen und **kräftig schütteln.** Mit restlichem Wasser auffüllen und erneut kräftig schütteln.
5. Den Flascheninhalt auf Trinktemperatur abkühlen lassen. **Temperatur vor dem Trinken überprüfen!**

SICHERE VERWENDUNG:

Bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung bitte stets die Gebrauchsanweisung beachten. Eine unsachgemäße Zubereitung oder jede Aufbewahrung der verzehrfertigen Nahrung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Die Nahrung bitte vor jeder Mahlzeit frisch zubereiten und sofort füttern. Nahrungsreste nicht wiederverwenden, sondern entsorgen. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Außerdem:

- Inhalt des geöffneten Beutels binnen 14 Tagen aufbrauchen
- Milchpulver im Alubeutel belassen und diesen nach jeder Entnahme gut verschließen und an einem trockenen, hygienischen Ort aufbewahren
- Immer nur den beiliegenden Messlöffel verwenden – diesen nicht erhitzen!
- Messlöffel nicht mit scharfen oder scharfkantigen Gegenständen abstreifen
- Säuglingsnahrung nicht in der Mikrowelle erwärmen (Verbrühungsgefahr!)

RICHTIG DOSIEREN – ERNÄHRUNGSPLAN UND MENGENANGABEN

Die Anzahl der Fläschchen und die empfohlene Trinkmenge im Ernährungsplan sind nur Richtwerte. Sie können sich individuell unterscheiden, geringe Abweichungen sind unbedenklich.

Ein gestrichener Messlöffel enthält etwa 4,4 g **Lactana Bio Folgemilch 2**.

Standardauflösung für 100 ml trinkfertige Flaschennahrung: 13,3 g (3 Messlöffel) Pulver + 90 ml frisch abgekochtes Trinkwasser.

Alter	Anzahl der Flaschenmahlzeiten pro Tag	Trinkmenge pro Flasche in ml	Dosierung pro Mahlzeit	
			abgekochtes Trinkwasser in ml	Anzahl Messlöffel
Nach dem 6. Monat	2 - 3	170	150	5
		200	180	6
		230	210	7

WICHTIGE HINWEISE

Für Babys ist ausschließliches Stillen in den ersten 6 Monaten ideal. In dieser Zeit sollte **Lactana Bio Folgemilch 2** – wie jede Folgemilch – nicht als Muttermilchersatz verwendet werden, sondern erst nach 6 Monaten als Bestandteil einer gemischten Ernährung. Individuelle Wachstums- und Ernährungsbedürfnisse des Babys können es aber erforderlich machen, Folgenahrungen als Teil einer Mischkost bereits früher in den Speiseplan aufzunehmen. In diesem Fall bitte vom Kinderarzt beraten lassen. Bitte auf eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise achten.

Für die Zähne ist häufiger oder dauernder Kontakt mit kohlenhydrathaltigen Nahrungen schädlich. Dieser kann schwere Zahnschäden (Karies) verursachen. Wie alle Säuglingsnahrungen enthält **Lactana Bio Folgemilch 2** Kohlenhydrate, z.B. Lactose. Eine Flaschenmahlzeit sollte deshalb nur so lange dauern wie der eigentliche Trinkvorgang. Bitte die Flasche nicht als Schnullerersatz oder zum Dauernuckeln überlassen und für eine regelmäßige Zahnpflege sorgen.

DE-ÖKO-001
EU/Nicht-EU-Landwirtschaft

SEIT 1911

Töpfer

Stand: Oktober 2021