

Hipp
T85-Zweitmarken
Folgемilch

125 g 85 x 200mm

Wichtige Hinweise

- Die ausschließliche Ernährung mit Muttermilch ist in den ersten sechs Monaten das Beste für Ihr Baby.
- Wenn nicht gestillt wird, sollte generell in den ersten sechs Monaten Anfangsmilch (z.B. Bebivita Pre oder 1) gegeben werden. Folgemilch (z.B. Bebivita 2) ist grundsätzlich nach dem 6. Monat vorgesehen und nicht als Muttermilchersatz in den ersten sechs Lebensmonaten.
- Bebivita 2 kann als Teil einer gemischten Beikosternährung (Glaskost, Milchbrei) gegeben werden.
- Die individuellen Wachstums- und Entwicklungsbedürfnisse Ihres Babys können es erforderlich machen, Folgenahrungen als Teil einer Mischkost bereits zu einem früheren Zeitpunkt (frühestens nach dem 4. Monat) einzuführen. Sprechen Sie dann mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme.
- Wie Muttermilch enthält auch Bebivita 2 Kohlenhydrate, die ein wesentlicher Bestandteil in der Ernährung Ihres Kindes sind. Bei andauerndem Kontakt von Zähnen mit kohlenhydrathaltiger Nahrung können schwere Zahnschäden (Karies) ausgelöst werden. Achten Sie deshalb darauf, dass Ihr Baby – wie bei einer Stillmahlzeit – nicht länger als für die Trinkmahlzeit nötig an der Flasche nuckelt. Geben Sie ihm die Flasche nicht als Schnullersatz oder zum Dauernuckeln. Lassen Sie Ihr Kind so früh wie möglich aus der Tasse trinken.

Neue Dosierung

Bitte beachten Sie bei der Zubereitung von Folgemilch genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung oder Aufbewahrung des zubereiteten Fläschchens über einen längeren Zeitraum kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen z.B. durch das Wachstum unerwünschter Keime führen. Die angegebenen Trinkmengen und die Anzahl der Fläschchen pro Tag sind Richtwerte, welche von Kind zu Kind variieren können. Ideal für Babys sind ca. 5 Mahlzeiten pro Tag. Für jede neu eingeführte Beikostmahlzeit (Glaskost/Brei) sollte eine Flaschenmahlzeit wegfallen.
Bitte beiliegenden Messlöffel verwenden.

Abgekochtes Wasser (ml)	Bebivita 2 Messlöffel	Trinkfertige Nahrung (ml)
120	4	135
150	5	170
180	6	200
210	7	235

Neue Zubereitung

- Trinkwasser für jede Flaschenmahlzeit frisch abkochen und auf ca. 40°–50°C abkühlen lassen.
- Die gewünschte Menge abgekochtes, abgekühltes Wasser (lt. Tabelle) in ein Fläschchen geben.
- Den Messlöffel aus dieser Packung locker füllen und mit dem Messrücken abstreifen. Das Pulver (lt. Tabelle) zu dem Wasser in das Fläschchen geben.
- Fläschchen verschließen und kräftig schütteln.
- Auf Trinktemperatur (ca. 37°C) abkühlen lassen – Temperatur überprüfen!



Sicherheitshinweise

- Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wieder verwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen.
- Geöffneten Beutel nach Produktentnahme gut verschließen, trocken und bei Raumtemperatur lagern. Inhalt des geöffneten Beutels innerhalb von 3 Wochen verbrauchen.
- Milchnahrung nicht im Mikrowellengerät erwärmen (Überheizungsgefahr!).

Wichtige Nähr- und Aufbaustoffe



* lt. Gesetz

Produkteigenschaften

Bebivita steht für 20 Jahre Markenqualität. Mit dieser Erfahrung wissen wir, worauf es ankommt.

- Bebivita 2 Folgemilch** enthält gemäß EU-VO alle wichtigen Nähr- und Aufbaustoffe, die ein älterer Säugling für seine gesunde Entwicklung braucht. Aufgrund ihrer besonderen Zusammensetzung sorgt sie für eine gute Sättigung und so für zufriedene Babys bei Tag und Nacht. Mit Bebivita 2 erhält Ihr Baby eine Folgemilch, die neben Beikosternährung ein altersgerechtes Wachstum unterstützt.
- Wertvolle ungesättigte Fettsäuren:**
 - Omega-3 Fettsäure (ALA) – diese essentiellen Fettsäuren können vom Körper nicht selbst hergestellt werden und sind wichtig für die Entwicklung von Gehirn- und Nervenzellen.
 - DHA, eine langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäure, die zur Familie der Omega-3 Fettsäuren gehört. Sie trägt zur Entwicklung der Sehkraft bei Säuglingen bei. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 100mg DHA ein.
- mit Vitamin C, D und Eisen****

* ab 02.2020 gesetzlich für Folgenahrung vorgeschrieben
** lt. Gesetz

Anwendung

Bebivita 2 Folgemilch ist die richtige Folgemilch für Säuglinge nach dem 6. Monat. Je nach Entwicklung Ihres Babys können Sie mit der Beikost auch früher von Anfangs- auf Folgenahrung umstellen (siehe wichtige Hinweise).

Bebivita 2 kann gegeben werden:

- im Anschluss an das Stillen
- im Anschluss an jede andere Anfangsmilchnahrung
- anstelle einer anderen Folgenahrung

Ab dem 10. Monat können Sie auf Bebivita 3 umstellen. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise Ihres Babys.

Bebivita Qualitätsgarantie - seit 20 Jahren

- Sorgfältig ausgewählte und streng kontrollierte Zutaten
- ständige Überprüfung während der Produktion
- Alle Kontrollen werden mit modernsten Methoden und nach strengen, deutschen Qualitätsstandards durchgeführt



Bebivita
MIT DEN BAUSTEINEN FÜRS LEBEN

Folgемилк



Nach dem 6. Monat

- Omega-3 (ALA) – für die Entwicklung von Gehirn- und Nervenzellen**
- DHA* – für die Entwicklung der Sehkraft**
- mit Vitamin C, D und Eisen****

* ab 02.2020 gesetzlich für Folgenahrung vorgeschrieben
** lt. Gesetz

2



NEUE REZEPTUR

Nährwerte

	pro 100 ml trinkfertiger Nahrung*	pro 100 ml trinkfertiger Nahrung*
Energie	285 kJ 68 kcal	Calcium 70 mg (13%)
Fett	3,7 g	Phosphor 38 mg (7%)
davon:		Magnesium 6,3 mg (8%)
- gesättigte Fettsäuren	1,6 g	Eisen 1,0 mg (13%)
- einfach ungesättigte Fettsäuren	1,6 g	Zink 0,50 mg (10%)
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren	0,5 g	Kupfer 0,054 mg (11%)
davon:		Mangan 0,0075 mg (1%)
- Linolsäure (Omega-6)	0,41 g	Fluorid <0,010 mg
- Linolensäure (Omega-3)	0,06 g	Selen 3,9 µg (20%)
- DHA	13,6 mg	Jod 15 µg (19%)
Kohlenhydrate	7,3 g	Vitamin A 56 µg (14%)
davon:		Vitamin D 1,6 µg (23%)
- Zucker	5,6 g	Vitamin E 0,90 µg (18%)
davon: Lactose ¹	5,6 g	Vitamin K 3,1 µg (26%)
- Stärke	1,7 g	Vitamin C 10 mg (22%)
Eiweiß	1,4 g	Vitamin B ₁ (Thiamin) 0,037 mg (7%)
Natrium	20 mg (5%)	Vitamin B ₂ (Riboflavin) 0,12 mg (17%)
Kalium	84 mg (8%)	Niacin 0,53 mg (8%)
Chlorid	52 mg (10%)	Vitamin B ₆ 0,042 mg (6%)
		Folsäure 10 µg (13%)
		Vitamin B ₁₂ 0,10 µg (13%)
		Pantotheninsäure 0,35 mg (12%)

¹natürlicher Milchzucker (Tagesbedarfsdeckung pro 100 ml gemäß Referenzwert)

Die Analysenwerte unterliegen den bei Erzeugnissen aus Naturprodukten üblichen Schwankungen.

* Standardauflösung: 100 ml trinkfertige Nahrung werden hergestellt aus 13,2 g Bebivita 2 und 90 ml abgekochtem Wasser.

1 gestrichener Messlöffel = ca. 4,4 g Bebivita 2.

Zutaten

Magermilch, pflanzliche Öle (Palmöl*, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Lactose, Molkenzucker, Stärke, Fischöl¹, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Emulgator Lecithine, Natriumcitrat, Calciummorthophosphate, Kaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, L-Tryptophan, Vitamin C, Eisensulfat, Vitamin E, Niacin, Zinkoxid, Pantothensäure, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B₂, Vitamin B₆, Vitamin B₁, Kaliumjodat, Folsäure, Mangansulfat, Natriumselenat, Vitamin K, Vitamin D, Biotin.

¹enthält DHA - DHA gehört zur Familie der Omega-3 Fettsäuren.

*aus nachhaltigem Anbau

Unter Schutzatmosphäre verpackt. Füllhöhe technisch bedingt. Trocken und bei Raumtemperatur lagern.

Originalverslossen mindestens haltbar bis: siehe Bodenlasche.

Folgемилк
e 500 g

bebivita.de
Bebivita GmbH
85276 Reisgang
Art.-Nr. 1117-01